

### Objectif 4- Réduire la transmission des IST et du VIH

Stratégie	Intervenants		Bénéficiaires	Objectifs spécifiques
	National	Local		
4.1 Renforcement de la communication et adaptation au contexte socioculturel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensemble des secteurs ministériels</li> <li>- ONG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Société civile</li> <li>- ONG</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Population générale</li> <li>- ONG et société civile</li> <li>- Secteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Former au moins 60% des professionnels de l'IEC à des techniques de communication adaptées</li> </ul>
4.2 Multiplication des actions éducatives de proximité (changement de comportements)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensemble des secteurs ministériels</li> <li>- ONG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Société civile</li> <li>- Leaders d'opinion</li> <li>- Personnes relais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Population générale</li> <li>- Groupes vulnérables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer la réalisation des actions de proximité pour 60% des relais nationaux (CIAJ, CFP, SEMEP..) et 30% de ces actions doivent être évaluées</li> </ul>
4.3 Promotion et accessibilité continues des préservatifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSP (DP -population)</li> <li>- Autres secteurs</li> <li>- Organisations internationales</li> <li>- Privé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ONG</li> <li>- Société civile</li> <li>- DSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Population générale</li> <li>- Jeunes</li> <li>- Population à comportement à risque</li> <li>- PVVIH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurer une disponibilité du préservatif à 80% dans les structures publiques, parapubliques et privées, accompagnée d'une prévention efficace</li> </ul>
4.4 Meilleur contrôle, diagnostic et thérapeutique, des IST courantes par un service de proximité combinant l'approche syndromique et un soutien biologique léger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSP</li> <li>- DSP</li> <li>- Secteur privé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DSP</li> <li>- Médecins spécialistes</li> <li>- Médecins généralistes formés</li> <li>- Biologistes</li> <li>- Personnel paramédical (sages femmes)</li> <li>- Médecins privés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Population générale</li> <li>- Groupes vulnérables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intégrer 100% des consultations IST au niveau de tous les centres de référence et au niveau de toute structure de santé opérationnelle (CHU- secteurs sanitaires- polycliniques)</li> </ul>

4.5 Développement et promotion du dépistage volontaire, anonyme et gratuit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSP</li> <li>- IPA (LNR)</li> <li>- Autres secteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratoires EHS, CHU, secteurs sanitaires</li> <li>- Médecins des structures publiques et parapubliques</li> <li>- cabinets privés</li> <li>- épidémiologistes</li> <li>- sages femmes</li> <li>- biologistes</li> <li>- psychologues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- INSP</li> <li>- MSP (DP)</li> <li>- ONG</li> <li>- CDR</li> <li>- Population générale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intégrer des CDAG au niveau des 6 centres de référence</li> </ul>
4.6 Renforcement de la prévention de la transmission du VIH en milieu de soins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CHU, secteurs sanitaires</li> <li>- Personnels sanitaires et ouvriers</li> <li>- Médecins du travail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personnel médical et paramédical et malades</li> <li>- CDR</li> <li>- Populations dans les structures de santé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Former 100% du personnel médical et paramédical à la prévention de la transmission en milieu de soins</li> <li>- Veiller à la disponibilité permanente du consommable nécessaire à la prévention</li> </ul>
4.7 Prévention de la transmission mère/enfant	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSP/DP</li> <li>- Organisations internationales</li> <li>- ONG internationales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Médecin d'hôpital de jour</li> <li>- Gynécologues</li> <li>- Sages femmes</li> <li>- PVVIH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Femmes séropositives</li> <li>- Femmes enceintes</li> <li>- Les enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% des femmes enceintes séropositives bénéficient de l'assistance thérapeutique et du suivi</li> </ul>
4.8 Maintien de la sécurité transfusionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MSP (DP)</li> <li>- Agence Nationale du Sang (ANS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsables de CTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malades à transfuser</li> <li>- Population générale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintenir à 100% le contrôle du sang et dérivés</li> </ul>